

TASECTAN®

Toepassing

Tasectan® is een medisch hulpmiddel dat gebruikt wordt om de fysiologische functies van de darmwand te herstellen. Tasectan® werd speciaal ontwikkeld om de symptomen van diarree van uiteenlopende oorsprong, zoals een opgezet buik en frequente ontlasting, onder controle te houden en te verminderen. Doeltreffend binnen 12 uur.

Gelatinetannaat, het werkzame bestanddeel van dit product, ondergaat geen wijzigingen in de maag en vormt een laagje dat het darmslijmvlies beschermt en zo de frequentie en de duur van de diarreeverschijnselen vermindert.

Verpakking

20 zakjes poeder voor gebruik bij kinderen.

Blisterverpakking met 15 of 45 capsules voor gebruik bij volwassenen.

Samenstelling

Poeder: 250 mg gelatinetannaat (afkomstig van varkens).

Capsules: 500 mg gelatinetannaat (afkomstig van varkens), maïszetmeel en magnesiumstearaat (van plantaardige oorsprong).

Gebruiksaanwijzing

Poeder: de inhoud van het zakje moet worden gemengd met een niet opgewarmde drank zoals melk, fruitsap of water en onmiddellijk worden ingenomen. Het kan eveneens worden toegevoegd aan yoghurt of elk ander voedsel. Neem het product niet rechtstreeks in zonder te mengen.

Capsules: de capsule inslikken met vloeistof.

Dosering

Kinderen jonger dan 3 jaar: 1 zakje om de 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn.

Kinderen van 3 tot 14 jaar: 1 à 2 zakjes om de 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn.

Volwassenen en kinderen ouder dan 14 jaar: 1 à 2 capsules om de 4 tot 6 uur totdat de symptomen verdwenen zijn.

Voorzorgen

- Het is niet nodig een professionele zorgverlener te raadplegen voordat u dit product gaat gebruiken. Het wordt echter aangeraden om dit wel te doen indien de symptomen ernstig zijn of aanhouden of indien er twijfel is over de diagnose.
- In geval van diarree bij kinderen jonger dan 3 jaar en bij ouderen, wordt u aangeraden contact op te nemen met uw professionele zorgverlener, vooral als er ook andere symptomen aanwezig zijn.
- Dit medisch hulpmiddel is geen farmacologische behandeling. Indien dergelijke behandeling door uw professionele zorgverlener wordt aangeraden, mag dit hulpmiddel gelijktijdig worden ingenomen.
- Het is aan te raden om een grote hoeveelheid vocht in te nemen en de gebruikelijke dieetmaatregelen bij de behandeling van diarree in acht te nemen.
- Hoewel geen bijwerkingen werden waargenomen, wordt afgeraden dit medisch hulpmiddel tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding te gebruiken, behalve wanneer anders geadviseerd door uw professionele zorgverlener.
- Gebruik dit product niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking.

- Gebruik het product niet als de blister of het zakje open of beschadigd is.
- Voor dit medisch hulpmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Niet in de vriezer bewaren.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

Contra-indicaties

Tasectan® niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor gelatinetannaat of voor één van de andere stoffen in dit product.

Verdeler

THERABEL PHARMA N.V.
Humaniteitslaan 292
B-1190 Vorst



NOVENTURE, S.L.
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcelona
España



CE
0373

Revisie: 04 van 01.09.2019